

Efectos secundarios de la anticoncepción

Efectos secundarios de la píldora anticonceptiva oral

Cáncer de seno y uterino

Depresión, náuseas

Dolores de cabeza y migrañas

Deseo sexual disminuido

99.7 por ciento efectivo si se usa perfectamente. Esto significa que menos de 1 de cada 100 mujeres quedarían embarazadas en 1 año.

Sin protección contra las ETS



Efectos secundarios de la inyección anticonceptiva.

Cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de útero, sangrado vaginal, cáncer de vagina

Pérdida de densidad mineral ósea.

Cada inyección es más de 99.5% efectiva para prevenir el embarazo y dura de 12 a 14 semanas.

Sin protección contra el VIH y otras ETS.



Efectos secundarios del implante anticonceptivo:

Enfermedades circulatorias, colesterol alto, deficiencia de proteínas, enfermedad renal, accidente cerebrovascular, coágulos sanguíneos, enfermedades cardíacas, cánceres femeninos.

Más del 99% de efectividad.

Sin protección contra las ETS.



Efectos secundarios del DIU


Sangrado excesivo.

El DIU puede perforar el útero y viajar a otras partes del cuerpo.

Si el DIU contiene hormonas, puede causar depresión, dolores de cabeza, cáncer, enfermedades circulatorias.

99% efectivo. Esto significa que menos de 1 de cada 100 mujeres quedarán embarazadas en un año.

Sin protección contra las ETS.



Efectos secundarios del parche anticonceptivo:

Cáncer de mama o de útero,
Coágulos de sangre, diabetes,
Enfermedad hepática, ataque
cardíaco, derrame cerebral

60% más de estrógeno que la
píldora.

Aproximadamente 9 de cada 100
usuarias de parches quedan
embarazadas cada año.

Sin protección contra las ETS.



Efectos secundarios del diafragma


Infección del tracto urinario

Irritación genital

Interrupción de la espontaneidad.

92% de efectividad en la prevención del embarazo

Sin protección contra las ETS.




Efectos secundarios de los condones.

Sensibilidad al látex

Romper o fugas

85% de efectividad en la prevención
del embarazo

95% de efectividad en la prevención de
la propagación del VIH.



Efectos secundarios de la vasectomía

A veces dolor escrotal crónico.


Inflamación de la epididimitis.

Sangre en orina o eyaculación.
(Busque ayuda médica).

Infección del sitio quirúrgico
después del procedimiento.

No evitar el embarazo: en casos
raros, los conductos deferentes que
se cortaron pueden volver a crecer
juntos con el tiempo. (El hombre
vuelve a ser fértil).

Sin protección contra las ETS.



Resultados negativos de la ligadura de trompas (esterilización femenina).


Fracaso para evitar el embarazo.

Las tasas de embarazo después de la esterilización varían, documentadas desde 7.5 por 1000 procedimientos hasta 36.5 por 1000 procedimientos.

Embarazo ectópico: aproximadamente un tercio de los embarazos que ocurren después de una ligadura de trompas serán embarazos ectópicos. El embarazo ectópico es potencialmente mortal para la madre y el bebé no puede sobrevivir.

Daño al intestino, vejiga o vasos sanguíneos principales. Dolor pélvico o abdominal continuo.

Sin protección contra las ETS.




Primera inyección anticonceptiva masculina

El Consejo Indio de Investigación Médica ha completado con éxito un ensayo clínico con un anticonceptivo masculino inyectable.

El método anticonceptivo, que dura aproximadamente 13 años, consiste en inyectar un polímero en el conducto deferente, impidiendo que los espermatozoides salgan de los testículos.

El producto está listo a la espera de las aprobaciones regulatorias [del gobierno],

Sin protección contra las ETS



Enfermedades de transmisión sexual:


Infecciones causadas por bacterias, virus o parásitos y transmitidas por contacto sexual.

El VIH es un virus que ataca las células que combaten las infecciones en el cuerpo, haciendo que una persona sea más vulnerable a otras infecciones y enfermedades.

Si no se trata, el VIH puede provocar la enfermedad del SIDA (síndrome inmunodeficiencia adquirida).

El SIDA es la etapa tardía de la infección por VIH que ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus.

Al tomar medicamentos contra el VIH (llamados terapia antirretroviral o TAR), las personas con VIH pueden vivir vidas largas y saludables y evitar la transferencia del VIH a sus parejas sexuales.



Increase of AIDS in Indonesia

Virus del papiloma humano (VPH)

Una cepa de VPH causa verrugas en varias partes del cuerpo.

Otra cepa causa un cuello uterino precanceroso y es una causa común de cáncer cervical.

Con un estilo de vida saludable y monógamo, el sistema inmunitario puede vencer el virus del VPH en 1 a 2 años.



Healthy
Cervix



HPV infected cervix

Herpes genital

Una infección viral de transmisión sexual marcada por pequeñas ampollas dolorosas que aparecen y dejan llagas que supuran o sangran.


Su clínica puede proporcionarle medicamentos antivirales. Estas píldoras pueden ayudarlo a sentirse mejor y acortar un brote.

No bese ni tenga contacto genital hasta que vea a su proveedor de salud, para evitar transmitir el herpes a otra persona.




Clamidia

Una infección bacteriana de transmisión sexual. A veces no hay síntomas. Los hombres pueden tener secreción del pene, dolor al orinar e hinchazón de los testículos. Las mujeres pueden tener flujo vaginal anormal con olor, sangrado entre períodos, períodos dolorosos, dolor abdominal con fiebre, dolor durante el coito, picazón o ardor en o alrededor de la vagina, o dolor al orinar. Si no se trata, la infección puede ingresar a las trompas de Falopio o al conducto deferente, causando inflamación y bloqueo que conducen a la infertilidad. Tratamiento: antibióticos.



Gonorrea

Una infección bacteriana de transmisión sexual que, si no se trata, puede causar infertilidad. Síntomas: hombres: micción dolorosa, secreción parecida a pus desde la punta del pene, dolor o hinchazón en un testículo. Síntomas: mujeres: aumento del flujo vaginal con olor, dolor al orinar, sangrado vaginal entre períodos, como después de una relación vaginal; dolor abdominal o pélvico Si está embarazada, el bebé puede infectarse durante el parto. Los ojos del bebé deben tratarse para evitar la ceguera. Tratamiento: antibióticos



Sífilis: una enfermedad bacteriana de transmisión sexual:

Etapa 1) Una o más llagas de sífilis (llamadas chancro) Los chancros suelen ser firmes e indoloros, o en ocasiones abiertos y húmedos.

Etapa 2) Sensación general de enfermedad. Etapa 3) Tumores, ceguera y parálisis. Puede dañar el sistema nervioso, el cerebro y otros órganos. Posiblemente fatal. Curado fácilmente en etapas tempranas con antibióticos.



Preguntas: mariezenack@gmail.com

<http://www.knowyourfertility.net/>

